

VIII COLEOPTERA, I: RHYSODIDAE, NITIDULIDAE, COLYDIIDAE, CUCUJIDAE, PASSANDRIDAE, DISCOLOMIDAE, CRYPTOPHAGIDAE, MYCETOPHAGIDAE, DRYOPIDAE.

Par A. GROUVELLE.

RHYSODIDAE.

*Rhysodes alticola*, n. sp.

*Elongatus, oblongus, nitidus, fusco-piceus. Antennae subincrassatae; articulis 2°—11° transversis, 11° apice pulvinate, haud acuto. Caput elongatum, suboblongum; lobis posticis elongatis, basi subacuminatis, intus angulosis et inter se admotis, antice cum margine laterali junctis; spatio mediano inter posticos lobos producto, acuminato, antice arcuatim attenuato. Prothorax elongatus subdepressus, capite latior, quadricostatus; costis subdepressis, sulcis externis basi latioribus; sulco mediano basi vix occluso, apice breviter aperto. Elytra valde punctato-striata; intervallis convexis, quam striis paulo angustioribus, 4°, 5° et 6° ante apicem conjunctis.*

*Long. 5 mill.*

Allongé, oblong, brillant, brun de poix. Antennes médiocrement épaisses, progressivement un peu atténuées vers l'extrémité, surtout à partir du milieu de la longueur; articles 2<sup>me</sup> à 11<sup>me</sup> transversaux, 11<sup>me</sup> au moins deux fois plus large que long, terminé par un bouton conique, surbaissé, émoussé. Tête suboblongue, un peu plus de deux fois plus longue que large au niveau des yeux; lobes postérieurs allongés, convexes, subacuminés à la base, anguleux et rapprochés en dedans, soudés en avant, près de la base des antennes aux bourrelets marginaux de la tête, espace médian en forme de fer de lance allongé, acuminé en arrière, engagé entre les lobes postérieurs jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux, terminé en avant par un lobe allongé, subparallèle, impressionné à l'extrémité. Prothorax subovale, subparallèle, environ une fois et un tiers plus long que large, plus large que la tête, arrondi en avant, subtronqué à la base, chargé sur le disque de quatre côtés longitudinales, subdéprimées, subégales; sillon interne légèrement rétréci au milieu, presque fermé à la base, étroitement ouvert à l'extrémité; sillons externes subégaux au sillon interne, ouverts aux extrémités, élargis dans la partie basilaire; sillons marginaux très étroits, visibles de dessus, sauf aux angles antérieurs. Elytres oblongs, plus larges que le prothorax, profondément

ponctués-striés; intervalles des stries convexes, un peu plus étroits que les stries; 4<sup>me</sup>, 5<sup>me</sup> et 6<sup>me</sup> intervalles soudés un peu avant le sommet de l'élytre, prolongés en un faible bourrelet, séparé, près du sommet, du 7<sup>me</sup> intervalle réduit à une courte carène émoussée, par une courte ligne de points qui vient se réunir à la 7<sup>me</sup> ligne ponctuée discoidale.

2 exemplaires. Kobo, 400 pieds.

Voisin de *R. longiceps*, Grouv., distinct par les carènes du prothorax toutes déprimées; voisin également de *R. intrusus*, Grouv. mais distinct par les intervalles des stries discoidales des elytres presque plus étroits que les stries.

### NITIDULIDAE

#### *Carpophilus dimidiatus*, Fabr.

*Carpophilus dimidiatus*, Fabr., 1792, Ent. Syst., p. 261.

*Carpophilus dimidiatus* var. *contingens*, Walk., 1858, Ann. Nat. Hist., (3) ii, p. 206.

1 exemplaire. Kobo, 400 pieds.

#### *Carpophilus obsoletus*, Er.

*Carpophilus obsoletus*, Er., 1843, Germ. Zeitschr., iv, p. 259.

1 exemplaire. Rotung, 1400 pieds.

#### *Haptoncus ocellaris*, Fairm.

*Haptoncus ocellaris*, Fairm., 1849, Rev. Zool., p. 363.

*Haptoncus tetragonus*, Murr., 1864, Monog. Nitid., p. 401.

2 exemplaires. Rotung, 1400 pieds.

#### *Ipidia variolosa*, Reitt. var.

*Ipidia variolosa*, Reitt., 1879, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 215.

1 exemplaire. Dibrugarh, N. E. Assam.

#### *Megauchenia angustata*, Er.

*Megauchenia angustata*, Er. (*Ischaena*), 1843, Germ. Zeitschr., iv, p. 288.

7 exemplaires. Kobo, 400 pieds.

#### *Megauchenia quadricollis*, Reitt.

*Megauchenia quadricollis*, Reitt., 1883, Notes Leyden Mus., v, p. 10.

3 exemplaires. Kobo, 400 pieds.

***Pria mirmidon*, n. sp.**

*Breviter ovata, convexa, nitidula, tenue flavo-pubescentis, picea; antennis, pedibus, bucca et abdominis ultimo segmento testaceis; capite prothoraceque interdum rufo-piceis. Antennae apud marem subelongatae; articulis 1°—5° plus minusve elongatis, vel subelongatis, 5° quam vicinis vix incrassatis, 6°—8° plus minusve transversis, 8°—11° piriformem clavam efficientibus; apud feminam breviores; articulis 8°—10° subcylindricam clavam efficientibus. Caput circiter tam elongatum quam latum, convexum ante antennarum bases arcuatim inflexum, antice truncatum, fronte dense punctulatum; labro profunde emarginato. Prothorax antice subvalde, postice vix angustus, transversus, dense punctulatus; margine antico parum emarginato; angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; lateribus arcuatis; basi subtruncata. Scutellum triangulare. Elytra lateribus arcuata, vix ampliata, apice conjunctim subtruncata, paulo breviora quam simul latiora, dense punctulata, pygidium obtegentia. Striae marginales posticarum coxarum juxta apicem inflexae. Feminae caput prothoraxque angustiores.*

*Long. 1.2 mill.*

Environ une fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, ovale, convexe, un peu brillant, à peine visiblement alutacé, couvert d'une pubescence flave, très fine, ne masquant pas la couleur du tégument, brun de poix avec la bouche, les antennes, le pygidium et les pattes testacés; tête et thorax parfois un peu rougeâtres. Antennes du mâle modérément allongées; 1<sup>er</sup> article épais, dilaté-arrondi au côté interne, environ une fois et demie plus long que large; 2<sup>me</sup> moins épais, également environ une fois et demie plus long que large; 3<sup>me</sup> plus étroit presque trois fois plus long que large; 4<sup>me</sup> suballongé; 5<sup>me</sup> un peu allongé, un peu plus large que 4<sup>me</sup> et 6<sup>me</sup>; 6<sup>me</sup> transversal; 7<sup>me</sup> subcarré; 8<sup>me</sup> très transversal, amorçant la massue; celle-ci piri-forme presque trois fois plus longue, y compris le 8<sup>me</sup> article, que large; 9<sup>me</sup> article transversal, en forme de tronc de cône; 10<sup>me</sup> à peine aussi long que 9<sup>me</sup>, sinué au sommet; 11<sup>me</sup> plus étroit que 10<sup>me</sup>, subacuminé au sommet, environ aussi long que large. Antennes de la femelle plus courtes que celles du mâle; massue subcylindrique. Tête du mâle à peine plus large que longue y compris les mandibules, rétrécie à la naissance des antennes, subparallèle en avant, tronquée au sommet, infléchie en arc vers la naissance des antennes; front convexe, densément pointillé; labre grand, profondément échancré; yeux saillants, n'échancrant pas les côtés du front, ceux-ci droits, convergents en avant. Prothorax rétréci en avant, à peine à la base, environ deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long, densément pointillé, mais moins fortement que la tête; bord antérieur faiblement échancré; angles antérieurs arrondis; côtés arqués, subparallèles un peu en avant des angles postérieurs, ceux-ci obtus; base subtronquée. Écusson triangulaire, égal à la base au quart de la longueur de la base du prothorax, très finement alutacé.

Elytres de la largeur du prothorax à la base, arrondis, à peine élargis sur les côtés, presque tronqués ensemble au sommet, un peu moins longs que larges ensemble, densément pointillés; marges latérales, étroitement rebordées; stries marginales des hanches postérieures infléchies à l'extrémité. Tibias allongés. Tête et prothorax plus étroits chez la femelle.

1 mâle, 2 femelles. Dibrugarh, N.É. Assam.  
Dans les fruits du *Pandarus odoratissimus*.

***Pria diluticollis*, n. sp.**

*Ovata convexa nitidula, flavo-aureo-pubescentis, fulvo-testacea, elytris piceis, apice dilutioribus. Antennae graciles; articulis 1°—5° plus minusve elongatis vel subelongatis; 6° et 7° transversis; 8°—10° piriformem clavam efficientibus. Caput transversum, convexiusculum, antice truncatum, tenuissime alutaceum, parce punctulatum, ante antennarum bases arcuatim inflexum; labro emarginato. Prothorax antice valde, postice vix angustus, transversus, alutaceus, subparce punctulatus; margine antico subtruncato; angulis anticis rotundatis; lateribus modice arcuatis, tenuissime marginatis; angulis posticis obtusis; basi subtruncata ad extremitates late subsinuata, tenuiter marginata. Scutellum triangulare, magnum. Elytra lateribus arcuata, sat ampliata, apice separatim breviter rotundata, vix breviora quam simul latiora, alutacea, subparce punctulata, punctis transversim vix perspicue strigosis. Striae marginales posticarum coxarum juxta apicem inflexae.*

Long. 1.5 mill.

Un peu plus d'une fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, ovale, modérément convexe, un peu brillant, alutacé, couvert d'une pubescence flave-dorée, ne masquant pas la couleur du tégument, fauve-testacé avec les elytres brun de poix plus clairs vers l'extrémité. Antennes grêles; 1<sup>er</sup> article épais, dilaté-arrondi en dedans, environ une fois et un tiers plus long que large; 2<sup>me</sup> moins épais, environ une fois et demie plus long que large; 3<sup>me</sup> plus étroit, deux fois plus long que large; 4<sup>me</sup> et 5<sup>me</sup> suballongés; 6<sup>me</sup> subtransversal; 7<sup>me</sup> transversal; 8<sup>me</sup> très transversal, amorçant la massue, celle-ci piriforme, environ deux fois plus longue, y compris le 8<sup>me</sup> article, que large; 9<sup>me</sup> article transversal, en forme de tronc de cône; 10<sup>me</sup> sensiblement aussi long que 9<sup>me</sup>, sinué au sommet; 11<sup>me</sup> plus long et plus étroit que 10<sup>me</sup>, subcylindrique, terminé à l'extrémité en forme de cône surbaissé. Tête un peu moins longue avec les mandibules que large avec les yeux, rétrécie à la naissance des antennes, puis subparallèle, tronquée en avant, infléchie en arc en avant des naissances des antennes; front subconvexe, éparsément pointillé; labre assez grand, fortement sinué; yeux médiocrement saillants, échancrant les marges du front, celles-ci convergentes en avant. Prothorax rétréci en avant; à peine à la base, un peu moins de deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long, assez éparsément pointillé; bord antérieur subtronqué; angles antérieurs arrondis; côtés faible-

ment arqués, sauf contre les angles postérieurs, très finement rebordés; angles postérieurs obtus; base tronquée, très largement subsinuée, rebordée vers les extrémités. Écusson triangulaire, occupant environ le quart de la longueur de la base du prothorax, éparsément et très finement pointillé. Élytres de la largeur du prothorax à la base, arqués sur les côtés, assez élargis, séparément et largement arrondis au sommet, presque aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, très étroitement rebordés sur les côtés, couverts d'une ponctuation plus forte que celle du prothorax, un peu éparsée, transversalement substrigieuse lorsqu'elle est vue de bas en haut. Stries marginales des hanches postérieures infléchies à l'extrémité. Tibias allongés.

1 exemplaire. Près Kalek, 2500 pieds.

#### *Amystrops montana*, n. sp.

*Ovata, convexa, nitida, parce tenue flavo-pubescent, rufo-testacea, elytris sat dilute rufo-castanea. Antennae subgraciles; 3° articulo elongato quam 2° paulo longiore, clava paulo minus duplo longiora quam latiora, ultimo articulo quam praecedente longiore et angustiore. Caput modice transversum, dense punctatum, antice truncatum; labro magno, profunde emarginato. Prothorax antice angustus, parcius sed fortius capite punctatus; margine antico late emarginato; angulis anticis rotundatis; lateribus rotundatis, basin versus parallelis, tenuiter marginatis; angulis posticis acutis, retrorsum productis, basi medio subtruncata, utrinque scutelli breviter sinuata, ad extremitates inflexa et tenuiter marginata. Scutellum magnum, subtriangulare, parce punctatum. Elytra ovata, in maxima latitudine prothorace vix latiora, ad apicem conjunctim truncata, breviora quam simul latiora, quam prothorace fortius et paulo densius punctata; angulis humeralibus rotundatis. Pygidium haud occultum, dense punctatum. Caput et prothorax infra subleves. Metasternum abdomenque parce punctulata.*

*Long. 1.6 mill.*

Ovale, un peu plus d'une fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, brillant, couvert d'une pubescence flave, fine, espacée, roux testacé avec les élytres roux marron clair. Antennes presque grêles; 1<sup>er</sup> article à peu près aussi long que large, dilaté arrondi au côté interne; 2<sup>me</sup> plus étroit que le 1<sup>er</sup>, environ une fois et demie plus long que large; 3<sup>me</sup> encore plus étroit, deux fois et demie plus long que large; 4<sup>me</sup> une fois et demie plus long que large; 5<sup>me</sup> un peu plus court que 4<sup>me</sup>; 6<sup>me</sup>, 7<sup>me</sup> et 8<sup>me</sup> progressivement plus transversaux; 8<sup>me</sup> plus large que 7<sup>me</sup>; 9<sup>me</sup> à 11<sup>me</sup> formant une massue compacte, un peu moins de deux fois plus longue que large, dont le dernier article est plus long et plus étroit que le précédent.

Tête environ une fois et demie plus large au niveau des yeux que longue avec les mandibules, densément ponctuée, biimpres-

sionnée entre les bases des antennes, rétrécie transversalement en avant des yeux, jusqu'à l'insertion des antennes, puis obliquement rétrécie et saillante en avant pour former l'épistome, celui-ci tronqué; labre grand, profondément échancré; yeux saillants. Prothorax à peine plus large en avant que la largeur de la tête, beaucoup plus large à la base, arrondi sur les côtés, parallèle à la base, plus de deux fois plus large à la base que long, plus éparsément et plus fortement ponctué sur le disque que la tête, bord antérieur largement échancré, finement rebordé aux extrémités; angles antérieurs arrondis, rebordés; côtés arqués, rebordés; angle postérieurs aigus, saillants en arrière; base tronquée au milieu, brièvement sinuée de chaque côté de l'écusson, puis subtronquée et réfléchiée en arrière, avant l'extrémité, rebordée de chaque côté de l'écusson. Écusson occupant environ le quart de la base du prothorax, subtriangulaire, éparsément pointillée. Elytres ovales, de la largeur du prothorax à la base, arrondis sur les côtés, à peine élargis, presque subtronqués ensemble au sommet, nettement moins longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, plus fortement ponctués que le prothorax, mais moins densément ponctué que lui sur les côtés; bords latéraux finement rebordés; angles huméraux arrondis. Pygidium bien découvert, triangulaire, densément pointillé. Dessous de la tête et du prothorax presque lisse; métasternum et abdomen densément ponctués. Sillons antennaires courts, convergents. Palpes maxillaires allongés, filiformes. Saillie prothoracique, subspatulée, dépassant le niveau des hanches. Mésosternum obliquement enfoncé.

6 exemplaires. Dibrugarh, N. E. Assam.  
Dans les fruits du *Pandarus odoratissimus*.

#### COLYDIIDAE.

##### *Xuthia parallela*, Sharp.

*Xuthia parallela*, Sharp, 1885, Journ. Linn. Soc. Lond., xix, p. 70.

1 exemplaire. Rotung, 400 pieds.

##### *Tarphiosoma kempí*, n. sp.

*Breviter ovatum, convexum, nitidum, atrum, antennis pedibusque rufo-piceum; corpore subtus setis erectis subinfuscatis, in elytris paulo longioribus et pilis plus minusve squamiformibus, sordido-ochraceis, ex parte in maculis densatis, vestito. Antennae subtenuae; 9° articulo quam praecedente paulo latiore. Caput transversum, utrinque late impressum, sat dense sed inaequaliter granosum. Prothorax transversissimus, antice quam postice paulo angustior, lateribus valide arcuatus ad angulos anticos breviter, posticos vix perspicue sinuatus, granosus; disco convexo, in longi-*

*itudinem subsulcato ; lateralibus marginibus late explanatis ; apice late profundeque emarginato, valde pulvinate-marginato ; angulis anticis acutis, lateribus praecipue ad basin obtuse denticulatis ; angulis posticis subrectis ; basi medio subtruncata, ad extremitates oblique retrorsum producta. Elytra ad basin prothoracis quam maxima longitudine latiora, apice conjunctim acuminata, paulo breviora quam simul latiora, valde lineato-punctata ; humeris haud rotundatis.*

*Long. 5 mill.*

En ovale court, convexe, brillant lorsqu'il est dégagé de l'enduit terreux que le couvre en général, noir, garni sur tout le dessus du corps de soies foncées ou jaune sale, dressées un peu plus longues sur les elytres que sur le prothorax et de poils plus ou moins squamiformes, plus nombreux sur le disque du prothorax et sur ses marges latérales et plus ou moins condensés sur les elytres, principalement sur deux bandes transversales ondulées, la première près de la base, la deuxième avant la declivité apicale. Antennes testacées-enfumées, presque grêles ; 6<sup>me</sup> article à peine plus étroit que le 5<sup>me</sup> ; 6<sup>me</sup> à 8<sup>me</sup> s'épaississant très légèrement ; 9<sup>me</sup> nettement plus large que 8<sup>me</sup> ; 9<sup>me</sup> et 11<sup>me</sup> formant une massue environ une fois et demie plus longue que large, dont le dernier article est un peu plus court et nettement plus étroit que le précédent. Tête près de deux fois plus large que longue, subdéprimée, largement impressionnée de chaque côté, couverte de granulations fortes vers la base, faibles sur l'épistome ; bord antérieur très largement arrondi, yeux non saillants ; labre grand, roux. Prothorax un peu plus rétréci en avant qu'à la base, fortement arrondi sur les côtés, légèrement sinué vers les angles antérieurs, à peine vers les angles postérieurs, présentant sa plus grande largeur vers le 1<sup>er</sup> tiers de la longueur à partir de la base, presque deux fois et demie plus large, dans sa plus grande largeur, que long dans sa plus grande longueur, couvert de granulations assez fortes, allongées sur les marges latérales, ponctué et longitudinalement sillonné sur le disque ; bord antérieur largement et profondément échancré, bordé par un fort bourrelet coupé par le sillon longitudinal du disque, angles antérieurs aigus, saillants en avant ; côtes obtusement denticulés dans la moitié basilaire, marges latérales très largement enplanées-concaves ; angles postérieurs droits, non émoussés ; base subtronquée au milieu, obliquement réfléchiée en arrière aux extrémités, convexité longitudinale forte, plus accentuée en avant, séparée du bourrelet antérieur par une forte dépression ponctué ; convexité transversale forte, presque séparée des marges latérales tuberculeuses par un sillon. Écusson petit, suborbiculaire. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax dans sa plus grande largeur, anguleux aux épaules, à peine élargis, acuminés ensemble au sommet, un peu moins longs que larges ensemble, ponctué en lignes de gros points enfoncés, à contour mal défini, déterminant des intervalles fortement

ondulés, marges latérales étroites, à peine marquées, tuberculeuses, renflées vers les épaules ; bords latéraux obtusement denticulés.

1 exemplaire. Kalek, 3800 pieds.

### *Hyberis similis*, n. sp.

*Oblongo-ovatus, convexus, nitidulus tuberculato-setosus, ater ; antennis rufo-fuscis ; tarsi rufis. Antennae subgraciles ; 3° articulo quam simul 1° et 2° brevior. Caput subtransversum, depressum, antice subtruncatum, occipite vix granosum. Prothorax transversus, subcordiformis, marginibus lateralibus sat late explanatus, granosus, antice in longitudinem sulco laevi impressus, ante médium, utrinque sulci duobus contiguus gibbis, valde tuberosus ; margine antico medio rotundato, sulco late marginato, utrinque valde sinuato ; angulis anticis acutis ; lateribus ante médium, valde rotundato-productis, dentatis ; basi sulcato-marginata. Elytra oblonga, apice conjunctim breviter rotundata, magis sesquolongiora quam simul latiora, in disco subconfuse et haud profunde lineato-punctata, in intervallis inaequaliter tuberosa ; punctorum intervallis subelevatis, ocellatis ; tuberis in disco interdum geminis ad latera et apicem versus magis ordinatis.*

*Long. 4.2 mill.*

Suboblong, environ trois fois plus long que large dans la plus grande largeur, fortement convexe, un peu brillant, couvert de tubercules plus ou moins développés, portant chacun une soie dressée, plus longue sur les elytres que sur la tête et le prothorax, noir avec les antennes roux enfumé et les tarsi rougeâtres. Antennes assez grêles ; 3<sup>me</sup> article environ deux fois plus long que large, plus court que les deux premiers réunis ; 4<sup>me</sup> plus court que 3<sup>me</sup> ; 4<sup>me</sup> à 7<sup>me</sup> progressivement plus courts ; 8<sup>me</sup> et 9<sup>me</sup> subégaux, suballongés, un peu plus longs que 7<sup>me</sup> ; 10<sup>me</sup> en forme de massue piriforme, pubescent sur la partie apicale. Tête subtransversale, déprimée, un peu moins longue que large avec les yeux, chargée de tubercules faibles et espacés sur l'occiput, plus forts et plus serrés entre les naissances des antennes, faibles et serrés sur l'épistome ; yeux échancrant le front, à peine saillants, sans soies dressées. Prothorax à peu près aussi large à la base qu'au sommet, subcordiforme, fortement dilaté, arrondi sur les côtes, environ deux fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que long, assez largement explané-concave sur les côtes, chargé de tubercules serrés, laissant libre, en avant, un court sillon longitudinal et formant de chaque côté du disque, sur une ligne transversale, une double gibbosité un peu allongée ; bord antérieur arrondi dans le milieu et bordé par un large bourrelet subdéprimé, coupé par le sillon longitudinal du disque ; angles antérieurs aigus, saillants en avant, n'atteignant pas le niveau du milieu du bord antérieur ; côtés fortement dentés ; angles postérieurs subaigus ; base tronquée devant l'écusson, largement sinuée de chaque côte, bordée par une forte strie

enfoncée. Écusson petit, suborbiculaire. Elytres largement arrondis aux épaules, alors un peu plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, arrondis faiblement dilatés sur les côtés, brièvement arrondis ensemble au sommet, plus d'une fois et demie plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, superficiellement et peu régulièrement ponctués sur le disque, chargés sur les intervalles de tubercules sétifères, plus ou moins forts, irrégulièrement distribués, parfois geminés; intervalles des points très légèrement relevés, ocellés; tubercules disposés en lignes plus régulières, vers l'extrémité et sur les marges latérales. Stries marginales des elytres bien marquées.

2 exemplaires. Kalek, 3800 pieds. Dessous les écorces.

**Trachypholis hispida**, Weber.

*Trachypholis hispida*, Weber (*Opatrum*), 1801, *Observ. Ent.*, i, p. 38.

1 exemplaire. Kobo, 400 pieds.

**Trachypholis decorata**, Grouv.

*Trachypholis decorata*, Grouvelle, 1911, *Notes Leyden Mus.*, xxxiii, p. 126.

2 exemplaires. Rotung, 1400 pieds.

**Trachypholis signata**, Grouv.

*Trachypholis signata*, Grouvelle, 1911, *Notes Leyden Mus.*, xxxiii, p. 128.

3 exemplaires. Rotung, 1400 pieds.

**CUCUJIDAE.**

**Cucujus kempí**, n. sp.

*Planus, capite prothorace, antennis, pedibus et corpore subtus niger, clytris ruber. Caput asperum, dense punctatum; punctis ex parte confluentibus; lobis posticis valde prominulis. Prothorax in maxima latudine minus duplo latior quam longior, valde asper, plus minusve crebre punctatus; punctis irregularibus saepius confluentibus, intervallis plus minusve valde elevatis; margine antico valde lateque pulvinate-marginato, pulvino postice medio et utrinque profunde excavato; lateribus arcuatis, denticulatis. Elytra in disco subregulariter lineato-punctata.*

*Long. 22 mill.*

Forme et aspect normal des *Cucujus*. Tête, prothorax, antennes, pattes et dessous du corps noirs; elytres rouges, de nuance un peu sanguine. Antennes s'épaississant assez sensiblement vers l'extrémité. Surface de la tête très inégale, irrégulièrement

ponctuée; points souvent confluent, leurs intervalles parfois élevés presque en carènes; lobes des angles postérieurs fortement saillants. Prothorax rétréci à la base, moins de deux fois plus large, dans sa plus grande largeur, que long dans sa plus grande longueur, denté sur les côtés; disque inégal comme celui de la tête; bord antérieur relevé, au milieu, en un large bourrelet se prolongeant sur le disque, en deux carènes courtes, largement émoussées, bordant en dedans une forte impression et limitant chacune en dehors le bord interne d'une impression également bien marquée; devant le milieu de la base deux impressions profondes, obliques divergentes. Elytres ponctués sur le disque en lignes presque régulières, points mieux marqués vers la base, atténués vers le sommet, plus ou moins confus sur la région scutellaire.

1 exemplaire. Geku, 10,000 pieds.

? *Uleiota atratula*, Reitt.

*Uleiota atratula*, Reitter, 1877, Mittheil. Munch. Ent. Ver., p. 24.

1 exemplaire. Rotung, 1400 pieds.

*Laemophloeus semilaetaneus*, n. sp.

*Oblongus, modice elongatus, depressus, nitidus, glaber, niger; elytris plus minusve nigro-piceis; singulo lata plaga laterali, lacteola notato; mandibulis, antennarum primo articulo, tarsisque rufis. Antennae elongatae; 1° articulo 2 et 1/2 longiore quam latiore; 2°—8° subelongatis, tribus ultimis parum incrassatis. Caput transversissimum, depressum, subdense irregulariterque punctatum, in disco in longitudinem bistriolatum, antice quinque sinuatum. Prothorax transversissimus, basin versus parum angustus, parce tenuissimeque punctulatus, utrinque unistriatus; lateribus arcuatis, angulis omnibus plus minusve rotundatis; basi inter strias dorsales tenuiter marginata. Scutellum subpentagonale, parce punctulatum. Elytra oblonga, vix sesquolongiora quam simul latiora, apice separatim late rotundata, vix perspicue punctulata, abdominis ultimum segmentum haud tegentia.*

Long. 2.5 mill.

Oblong, modérément allongé, déprimé, brillant, glabre, noir; elytres plus ou moins noir de poix, marqués chacun d'une grande tache lactescente, latérale, n'atteignant pas l'épaule, le sommet et la suture; mandibules, 1<sup>er</sup> article des antennes et tarses rougeâtres. Antennes atteignant presque le milieu de la longueur des elytres; 1<sup>er</sup> article environ deux fois plus long que large; 2<sup>me</sup> à 8<sup>me</sup> submoniliformes; 2<sup>me</sup> et 3<sup>me</sup> subégaux, un peu plus longs que larges; 4<sup>me</sup> à 8<sup>me</sup> un peu plus longs que les précédents; 9<sup>me</sup> à 11<sup>me</sup> formant une massue lâche, peu accentuée, dont les deux premiers articles sont environ aussi longs que larges et dont le dernier est un peu

plus long que les précédents. Tête environ deux fois et demie plus large que longue y compris les mandibules, déprimée, plus ou moins densément ponctuée, marquée sur le disque de deux courtes stries légèrement divergentes; bord antérieur cinq fois sinuée entre les naissances des antennes, subrebordé dans la partie des trois sinuosités internes; bords latéraux convergents en avant, dans la partie qui précède les yeux, rebordés; yeux modérément saillants; mandibules assez rapprochées à la base, saillantes. Prothorax rétréci vers la base, un peu plus étroit que la tête avec les yeux, environ deux fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que long, éparsément et à peine visiblement pointillé, strié de chaque côté; stries convergentes vers l'arrière, réunies à l'extrémité par une strie qui borde la base; tous les angles plus ou moins arrondis; côtés arqués-rebordés. Ecusson subpentagonal, plus large que long, très éparsément ponctué. Elytres à la base de la largeur du prothorax un peu en avant des angles postérieures, arqués sur les côtés, peu élargis, en angles obtus émoussés aux angles postérieurs externes, largement et séparément arrondis au sommet, environ une fois et demie plus longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, à peine visiblement pointillés. Dernier segment de l'abdomen largement visible, presque éparsément pointillé.

1 exemplaire mâle. Rotung, 1400 pieds.

#### **Laemophloeus subturcicus, n. sp.**

*Elongatus, subparallelus, subdepressus, nitidulus, pube flava brevi tenuique vestitus, ferrugineus, antennis pedibus elytrisque paulo dilutus. Antennae elongatae, apud marem haud clavatae, apud feminam subclavatae; 2° articulo quam 3° longiore. Caput transversum, subtriangulare, antice sinuatum, subdense punctulatum; lateribus convergentibus, tenuiter marginatis, juxta antennarum basin subelevatis; stria interantennali arcuata, praecipue ad extremitates manifesta; oculis modice prominulis. Prothorax transversus, antice vix, postice sat valde angustus, dense punctatus, utrinque unistriatus, margine antico vix arcuato; angulis anticis subobtusis; lateribus arcuatis, ad basin sinuatis et tenuiter marginatis; angulis posticis rectis, haud hebetatis; basi truncata, utrinque sinuata, margine basilari medio pulvinate-elevato. Scutellum subtriangulare, transversum. Elytra prothorace vix latiora, subparallela, ad apicem modice attenuata et apice separatim late rotundata, 2 et 1/3 tam elongata quam simul lata, in disco sex striata; striis 1<sup>a</sup> (suturali) 3<sup>a</sup> et 5<sup>a</sup> impressioribus, 2<sup>a</sup> ad basin attenuata; intervallo suturali bilineato-punctulato, aliis plus minusve regulariter unilineato-punctulatis; margine laterali, juxta sextam striam carinato-plicato.*

*Long. 1.6—1.8 mill.*

Subparallele, environ trois fois et demie plus long que large, subdéprimé, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave, fine,

très courte, brun ferrugineux avec les elytres, les antennes et les pattes un peu plus clairs. Antennes allongées, atteignant chez le mâle le deuxième tiers de la longueur des elytres; 2<sup>me</sup> article très nettement plus long que large; 3<sup>me</sup> également plus long que large, mais plus court que le 2<sup>me</sup>; 4<sup>me</sup> deux fois plus long que large; 5<sup>me</sup> plus long que 4<sup>me</sup> et 6<sup>me</sup>; 6<sup>me</sup> à 11<sup>me</sup> tous allongés, plus de deux fois et demie plus longs que larges, également épais; chez la femelle l'antenne atteint environ le milieu de la longueur de l'elytre, les articles sont relativement moins longs et les trois derniers forment une massue lache, très peu accentuée. Tête un peu moins de deux fois plus large que longue en tenant compte des mandibules et des yeux, subtriangulaire, longitudinalement un peu convexe, assez densément pointillée; bord antérieur largement sinué; côtés convergents, très finement rebordés, relevés vers la naissance des antennes; strie interantennaire arquée, mieux marquée aux extrémités; tempes parallèles; yeux médiocrement saillants; labre largement et faiblement arrondi au sommet, moins de trois fois plus large que long. Prothorax à peine rétréci en avant, assez fortement à la base, environ une fois et un tiers plus large en avant que long, couvert d'une ponctuation presque serrée, un peu plus forte que celle de la tête, longitudinalement uni-strié de chaque côté, longitudinalement déprimé sur le disque, relevé en bourrelet sur la partie médiane de la base; bord antérieur à peine arqué; angles antérieurs subobtus; côtés très finement rebordés, arqués, sinués vers les angles postérieurs; ceux-ci droits, non émoussés; base tronquée, sinuée de chaque côté. Écusson subtriangulaire, très transversal. Elytres sinués à la base, arrondis aux épaules, alors à peine plus larges que le prothorax, subparallèles, atténués dans la partie apicale, largement et séparément arrondis au sommet, environ deux fois et un tiers plus longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, chacun avec six stries ponctuées sur le disque, 1<sup>re</sup> strie (suturale), 3<sup>me</sup> et 5<sup>me</sup> un peu plus marquées, 2<sup>me</sup> atténuée à la base; intervalle sutural avec deux lignes de très petits points, les autres avec une ligne ponctuée irrégulière; intervalles alternes subélevés vers le sommet; marges latérales limitées par une carène contre la 6<sup>me</sup> strie, à peine rebordées-explanées. Pas de stries fémorales sur le 1<sup>er</sup> segment de l'abdomen. Mesosternum se développant dans un plan à peine oblique par rapport au plan du métasternum. Hanches antérieures très écartées, leurs cavités ouvertes.

Inde (dans le corps d'un Bupreste); Yunnan (avec un lot de Cetoines moisies). Plusieurs exemplaires; Collection A. Grouvelle.

1 exemplaire. Sadiya, N. E. Assam.

### *Laemophloeus proximus*, Grouv.

*Laemophloeus proximus*, Grouvelle, 1908, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 466.

1 exemplaire. Dosing, 1400 pieds.

**Silvanus lateritius**, Reitt.

*Silvanus lateritius*, Reitter, 1878, Verhandl. zool. bot. Gesells. Wien, p. 194.

Nombreux exemplaires. Rotung, Sadiya, Pang-i.

*PASSANDRIDAE.***Hectarthrum trigeminum**, Newm.

*Hectarthrum trigeminum*, Newman, 1839, Ann. Nat. Hist., ii, p. 393.

5 exemplaires. Kobo, 400 pieds.

*DISCOLOMIDAE.***Holophygus rugosus**, n. sp.

*Suborbicularis, latior quam longior, convexus, nitidus, setis tenuibus, erectis, subinfuscatis, subdense vertitus, nigro piceus; antennis, corpore subtus, pedibus et saepius prothoracis elytrorum que marginibus explanatis dilutioribus. Antennae subgraciles; 1° et 3° articulis elongatissimis. Caput fronte depressum, late rugosum. Prothorax transversissimus, lateribus subanguloso-productus, ante anguli apicem sinuatus, subdense valdeque punctatus, in longitudinem sulcatus; marginibus lateralibus latissime explanatis; basi medio breviter truncata, utrinque late sinuata, marginata. Elytra basi quam prothorax latiora, fere semicircumducta, circiter simul 1 et 1/2 latiora quam longiora, crebre punctata; angulis humeralibus antrorsum rotundato-productis; marginibus lateralibus late explanatis, sublaevibus, undulatis. Femora apicem versus intus dentata.*

Long. 1.8—2 mill.

Suborbiculaire, plus large que long, convexe, explané sur les côtés, brillant, couvert de soies dressées, fines plus ou moins enfumées, brun de poix, nettement plus clair sur les antennes, les pattes, le dessous du corps et parfois les marges explanées. Antennes assez grêles; 1<sup>er</sup> article épais, arqué, plus de trois fois plus long que large; 2<sup>me</sup> encore un peu épais, subcarré; 3<sup>me</sup> environ quatre fois plus long que large; 4<sup>me</sup> environ deux fois et demie; 5<sup>me</sup> presque deux fois; 6<sup>me</sup> environ une fois et demie; 7<sup>me</sup> un peu plus court que 6<sup>me</sup>; 8<sup>me</sup> en forme de massue piriforme, composée de trois articles soudés. Tête déprimée, sur le disque, réserrée en avant des antennes, puis dilatée, infléchie, couverte de rugosités peu serrées; bord antérieur tronqué; labre petit. Prothorax beaucoup plus large que la tête, dilaté en angle émoussé sur les côtés, sinué, subcrénelé en arrière de ces angles, presque quatre fois plus large, dans sa plus grande largeur, que long dans sa plus grande longueur, plus ou moins éparsément ponctué sur le

disque, longitudinalement sillonné; bord antérieur largement échancré; angles antérieurs obtus, médiocrement saillants en avant; marges latérales très largement explanées, presque lisses, bordées par un fin bourrelet peu marqué; angles postérieurs obtus, parfois subdentés, base tronquée devant l'écusson, largement sinuée de chaque côté, rebordée. Écusson petit, subtriangulaire. Élytres contigus à la base du prothorax, plus larges, réfléchis obliquement en avant, pour former des angles huméraux saillants en avant, fortement émoussés, arrondis, à peine élargis sur les cotés, arrondis ensemble au sommet, environ une fois et demie plus larges que longs, couverts d'une ponctuation forte, très serrée, donnant un aspect rugueux; marges latérales explanées, moins larges que celles du prothorax, presque lisses; bords largement subondulés. Fémurs postérieurs dentés au côté interne, avant l'extrémité.

9 exemplaires. Kobo, 400 pieds. Dessous les écorces.

### CRYPTOPHAGIDAE.

#### *Diphyllus odiosus*, n. sp.

*Ovatus, sat latus, convexus, nitidus, pube cinerea, brevi vestitus, testaceo-castaneus; antennis pedibusque paulo dilutioribus. Antennae subincrassatae; 3° articulo elongato, clava magis duplo longiore quam latiore, ultimo articulo oblongo. Caput transversum, convexiusculum, rugosulum et plus minusve dense punctatum, ante antennatum bases modice productum, antice subtruncatum. Prothorax antice valde angustus, basi 2 et 1/3 latior quam longior, utrinque in longitudinem bicarinatus; carina externa integra, interna postice abbreviata, minus elevata; disco plus minusve, marginibus lateralibus dense, punctatis; punctis, in disco duo elongata laevia spatia reliquantibus; margine antico arcuato, ad extremitates sinuato; angulis anticis obtusis; lateribus arcuatis, tenuiter marginatis; angulis posticis acutis, retrorsum modice productis; basi medio arcuata, utrinque sinuata, ad extremitates quam in medio strictius marginata. Scutellum transversum, apice rotundatum. Elytra basi quam prothorace haud latiora, lateribus arcuata, vix ampliata, apice conjunctim brevissime rotundata, circiter 1 et 2/3 longiora quam simul latiora, lineato punctata; punctis juxta basin et ad latera majoribus, ad apicem praecipue juxta suturam attenuatis; intervallis linearum latis, in disco planis, ad latera subconvexis. Lineae marginales intermediarum coxarum arcuata, episternum ante apicem attingentes; lineae femorales internae coxarum posticarum rectae, parallelae, integrae, externae rectae, integrae, obliquae.*

*Long. 2.2 mill.*

Ovale, environ deux fois et un tiers plus long que large dans la plus grande largeur, convexe, brillant, testacé-marron avec les antennes et les pattes plus claires, couvert d'une pubescence cen-

drée, fine, inclinée, courte sur le disque, plus longue vers les côtés. Antennes un peu épaisses; 1<sup>er</sup> article épais, carré, 2<sup>me</sup> moins épais, suballongé; 3<sup>me</sup> environ deux fois plus long que large; 4<sup>me</sup> à 6<sup>me</sup> subégaux, un peu allongés; 7<sup>me</sup> à 9<sup>me</sup> s'épaississant progressivement et faiblement; 7<sup>me</sup> et 8<sup>me</sup> subcarrés; 9<sup>me</sup> subtransversal; 10<sup>me</sup> et 11<sup>me</sup> formant une massue donc le 1<sup>er</sup> article, en forme de tronc de cône, est environ aussi long que large au sommet et dont le 2<sup>me</sup> article est suboblong, plus étroit que le précédent. Tête plus de deux fois plus large que longue, transversalement un peu convexe, subtronquée en avant, modérément saillante en avant des bases des antennes, ruguleuse, plus ou moins densément ponctuée de points relativement gros; yeux gros, assez saillants, presque glabres, facettes moyennes. Prothorax fortement rétréci en avant, régulièrement arqué sur les côtés, parallèle contre la base, environ deux fois et un tiers plus large à la base que long, très faiblement convexe dans la longueur sauf en avant, longitudinalement bicaréné de chaque côté; carènes externes subrectilignes, partant de l'angle postérieur, rejoignant le bord antérieur assez près de ses extrémités, carènes internes antérieures courtes, moins élevées, modérément éloignées des externes; ponctuation plus ou moins serrée sur le disque, laissant libres deux étroites bandes longitudinales, rapprochées, plus forte et plus serrée vers les côtés; bord antérieur arrondi au milieu, sinué de chaque côté; rebordé entre les carènes; angles antérieurs obtus, peu émoussés; bords latéraux finement rebordés, brièvement ciliés, angles postérieurs aigus, un peu saillants en arrière, base largement sinuée de chaque côté, bordée par une strie plus rapprochée du bord aux extrémités qu'au milieu. Écusson environ deux fois plus large que long, arrondi au sommet. Elytres aussi larges à la base que le prothorax, en angles obtus aux épaules, formant avec les côtés du prothorax un angle à peine marqué, arrondis sur les côtés, à peine élargis, présentant leur plus grande largeur vers le premier sixième de la longueur à partir de la base, presque acuminés ensemble au sommet, environ une fois et deux tiers plus longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, ponctués en lignes; points plus accentués à la base et sur les marges latérales, atténués vers le sommet, presque effacés contre la suture, sauf à la base; base des elytres à peine rebordée en bourrelet de chaque côté de l'écusson; lignes suturales dédoublées à la base, presque effacées en dehors de la partie géminée; intervalles des lignes ponctuées plans sur le disque, subconvexes vers les côtés, à peine visiblement pointillés; calus huméraux faiblement marqués. Méta sternum longitudinalement substrié. Lignes fémorales internes des hanches intermédiaires effacées, lignes externes arquées, rejoignant l'épisternum un peu avant l'extrémité; lignes fémorales des hanches postérieures droites, entières; les internes parallèles, les externes obliques, atteignant le sommet du premier segment de l'abdomen près de ses extrémités.

1 exemplaire. Kobo, 400 pieds.

**Diphyllus molestus, n. sp.**

*Oblongus, convexus, nitidus, pube flava vestitus, ater; singulo elytro rufo-fulvo bimaculato; 1<sup>a</sup> macula humerali, 2<sup>a</sup> apicali, ambabus linea stricta parum manifesta conjunctis. Antennae graciles; articulis 3<sup>o</sup>—5<sup>o</sup> elongatis, subaequalibus; clava paulo duplo longiore quam latiore, articulis subaequalibus, ultimo quam praecedente vix angustiore, apice subacuminato. Caput transversum, transversim convexus, dense punctatum, ante antennarum bases modice productum, antice subtruncatum. Prothorax antice valde angustus, basi magis duplo latior quam longior, utrinque bicarinatus; carina externa cum latere subparallela, interna postice abbreviata, minus elevata; disco inter externas carinas subdense punctato, punctis ad latera paulatim validioribus et densioribus; margine antico utrinque modice sinuato; angulis anticis obtusis, hebetatis; lateribus arcuatis, tenuiter marginatis, praecipue ad basin ciliatis, angulis posticis acutis, retrorsum modice productis; basi medio truncata utrinque sinuata, ad extremitates quam in medio evidenter strictius marginata. Scutellum transversissimum, apice truncatum. Elytra basi quam prothorax haud latiora, lateribus arcuata, vix latiora, apice conjunctim subacuminata, 2 et 1/3 longiora quam simul latiora, lineato-punctata, punctis juxta basin et ad latera majoribus, apicem versus attenuatis, intervallis linearum latis, depressis, punctulatis. Lineae internae metasterni apice abbreviatae, externae episternum ante apicem attingente; lineae internae abdominis primi segmenti apice abbreviatae, subrectae, divergentes, externae integrae, subrectae.*

*Long. 2.2 mill.*

Oblong, environ trois fois plus long que large dans la plus grande largeur, convexe, brillant, couvert d'une pubescence flave assez serrée, plutôt courte, noir avec deux taches subferrugineuses sur chaque elytre; la première humérale, oblique, la deuxième apicale, toutes deux réunies par une bande longitudinale, de même couleur, mal définie comme nuance et comme contour. Antennes grêles; 1<sup>er</sup> article épais, un peu plus long que large; 2<sup>me</sup> moins épais, également un peu plus long que large; 3<sup>me</sup> et 4<sup>me</sup> subégaux, environ deux fois plus longs que larges; 5<sup>me</sup> un peu allongé; 6<sup>me</sup> à 9<sup>me</sup> subcarrés; 10<sup>me</sup> et 11<sup>me</sup> formant une massue dont le 1<sup>er</sup> article, presque en forme de tronc de cône, est presque aussi long que large au sommet et dont le second, à peine plus étroit que le premier, mais un peu plus long, est suboblong, subacuminé à l'extrémité. Tête plus de deux fois plus large que longue, transversalement un peu convexe sur le front, subpliée en arc entre les antennes et infléchie, subtronquée au bord antérieur, modérément saillante en avant des bases des antennes, couverte de gros points plus ou moins serrés; yeux gros, assez saillants, presque glabres, facettes assez fortes. Prothorax fortement rétréci en avant, régulièrement arqué sur les côtes, ceux ci convergents dès la base, environ deux fois et demie plus large à la base que long, très faiblement convexe dans la longueur sauf en avant, longitudinale-

ment bicarène de chaque côté; carènes externes arquées, prenant naissance près des angles postérieurs, rejoignant le bord antérieur en s'écartant progressivement, mais très lentement du bord latéral; carènes internes, antérieures, courtes, moins élevées, modérément éloignées des externes; ponctuation écartée, moins forte sur le disque, devenant plus forte et plus serrée vers les carènes externes, presque disposée en lignes entre les carènes internes et externes, moins forte en dehors des carènes externes qu'en dedans; bord antérieur arrondi au milieu, sinué sur les côtes, rebordé entre les carènes internes et externes; angles antérieurs obtus, émoussés, bords latéraux finement rebordés, ciliés; angles postérieurs aigus, un peu saillants en arrière, base tronquée au milieu, largement sinuée de chaque côté, bordée par une strie plus enfoncée et plus rapprochée du bord au milieu qu'aux extrémités. Écusson environ quatre fois plus large que long, tronqué au sommet. Elytres aussi larges à la base que le prothorax, en angle obtus aux épaules, formant avec les côtés du prothorax un angle à peine marqué, arrondis sur les côtés, à peine élargis, présentant leur plus grande largeur vers le premier quart de la longueur à partir de la base, subacuminés ensemble au sommet, environ une fois et un tiers plus longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, ponctués en lignes; points plus accentués à la base et sur les marges latérales, atténués vers le sommet; lignes suturales dédoublées à la base, presque effacées en dehors de la partie geminée; intervalles des lignes ponctuées larges et plans, pointillés; calus huméraux marqués. Métasternum finement strié dans la longueur, densément pointillé. Lignes femorales internes des hanches intermédiaires n'atteignant pas le sommet du segment, arquées, subparallèles à l'extrémité; externes arquées, rejoignant l'épisternite avant l'extrémité; lignes femorales internes des hanches postérieures n'atteignant pas le sommet du segment de l'abdomen, subrectilignes, divergentes; externes entières, rectilignes, atteignant le sommet du premier segment près de ses extrémités.

1 exemplaire. Sadiya, N. E. Assam. Dessous les écorces.

#### MYCETOPHAGIDAE.

*Litargus*, sp. ?

Rotung, 1400 pieds.

#### DRYOPIDAE.

*Dryops monticola*, n. sp.

*Oblongo-elongatus*, *convexus*, *fusco-olivaceus*, *flavo-cinereo-pruinosis*, *sat longe denseque subfusco-flavo-pubescentis*; *antennis pedibusque rufo-fuscis*. *Prothorax*, *transversus antice angustus*, *in longitudinem vix perspicue carinatus*, *subdense punctatus*, *lateribus marginatus*; *lateralibus carinis subrectis*; *pilis pruinosis ad medium disci convergentibus*. *Scutellum lateribus arcuatum*, *apice acuminata-*

*tum. Elytra paulo duplo longiora quam simul lata, apice subacuminata, lineato-punctata; intervallis vix perspicue convexis, tenuiter parce punctulatis.*

*Long. 3.2 mill.*

Oblong, presque trois fois plus long que large, convexe, noir olivâtre, revêtu d'une pruinosité flave-cendrée, plus accentuée vers la nuance flave sur le prothorax, entremêlée de poils plus sombres, peu allongés, plus serrés et plus redressés sur la tête et le prothorax que sur les élytres, mais ne masquant pas la couleur du tégument; antennes et pattes d'un roux sombre. Antennes un peu plus rapprochées entre elles, à la base, que de la direction longitudinale du bord interne des yeux. Tête subéparsement pointillée sur le disque, plus densément contre les yeux. Prothorax rétréci en avant, un peu moins de deux fois plus large à la base que long dans sa plus grande longueur, à peine visiblement subcaréné dans la longueur, un peu moins densément mais plus fortement ponctué que la tête; angles antérieurs aigus, saillants; côtés arqués, rebordés, carènes latérales presque droites lorsque'elles sont vues de face, bien marquées sur toute la longueur, subimpressionnées contre leur bord interne, vers le premier tiers de la longueur à partir de la base; convexité longitudinale plus marquée en avant, transversale brusquement très atténuée de chaque côté sur les marges externes des carènes latérales; pruinosité formant sur le milieu du disque un centre de convergence. Écusson en triangle fortement curviligne; subéquilatéral. Elytres un peu plus larges après les épaules que le prothorax à la base; subparallèles, subacuminés ensemble au sommet, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble, ponctués en lignes bien marquées surtout à la base, effacés au sommet; intervalles très légèrement convexes, éparsement et très finement pointillés. Tarses intermédiaires presque aussi longs que les tibias.

2 exemplaires. Yembung, 1100 pieds.

### **Dryopidius montanus, n. sp.**

*Ovatus, elongatus, convexus, nitidus vix perspicue pubescens, niger; pedibus nigro-piceis, tarsis plus minusve rufo-piceis. Caput tenuissime alutaceum, subparce punctulatum, ante antennarum bases arcuatim inflexum, antice subtruncatum. Prothorax transversus, antice angustus, in disco tenue, ad latera validius parce punctulatus; margine antico late emarginato; angulis anticis acutis, productis; lateribus tenue marginatis, antice modice arcuatis, postice subrectis, convergentibus; angulis posticis acutis, retrorsum productis; basi pro scutello emarginata, utrinque late sinuata. Scutellum subpentagonale. Elytra subaspera, subdense punctulata.*

*Long. 3 mill.*

Ovale, plus de deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, brillant, à peine visiblement pubes-

cent, noir; pattes noir de poix, tarsi plus ou moins rougeâtres. Tête très finement alutacée, presque éparsément ponctuée, légèrement infléchie en avant des naissances des antennes, subtronquée au bord antérieur. Prothorax rétréci en avant, environ deux fois plus large à la base que long, couvert d'une ponctuation plus éparsée que celle de la tête, très fine sur le disque surtout devant l'écusson, plus forte vers les côtés; bord antérieur largement et profondément échancré; angles antérieurs aigus, saillants en avant, très finement rebordés de chaque côté; bords latéraux également très finement rebordés, arqués en avant, subrectilignes, convergents dans la partie basilaire; angles postérieurs aigus, saillants en arrière; base échancrée devant l'écusson, largement sinuée de chaque côté, bordée aux extrémités par une ligne de très petits points. Écusson subpentagonal, un peu plus long que large. Elytres arqués sur les côtés, formant un angle très obtus avec les côtés du prothorax, acuminés ensemble au sommet, environ deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, presque subrapeux, couvert d'une ponctuation subéparse, irrégulièrement serrée, plus forte que celle des côtés du prothorax; base rebordée par un bourrelet à peine marqué. Tarsi allongés, presque aussi long que le tibia.

2 exemplaires. Yembung, 1100 pieds.

